



توب فيرت للصناعات الكيماوية

توب روز
منشط عام للتزهير

مكونات المركب : التركيز:

بورون : 0.8%	بوتاسيوم : 15%
موليبدينم : 0.1%	زنك : 3%

مميزات المركب :

- المركب يحتوى على أغلب العناصر التي تساعد على عملية الازهار والتي يحتاجها النبات في هذه المرحلة.
- سماد سائل يوفر عناصر البوتاسيوم والزنك والبورون والموليبدينم في صورة ميسرة وسهلة الامتصاص.
- يساعد على تقليل فترة الازهار مما ينتج أزهارا متناسقة متكاملة.
- وجود الزنك يحفز إنتاج السيبتوكينين والذي يقوم بدوره في تحرير صبغات الألوان وتكوين تلوين متوازن للثمار.
- أنواع المحاصيل التي يستخدم فيها المركب : يستخدم لجميع المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ونباتات الزينة.

معدلات الاستخدام الجرعة /فدان :

1- في حالة الرش الورقي يستخدم بمعدل 100 – 150 سم³ / 100 لتر ماء ويكرر الرش خلال مراحل النمو المختلفة للنبات.

2- في حالة الأضافة مع ماء الري يستخدم بمعدل 1.5 – 2 لتر ماء.

التخفيف : من 1 – 1.5 سم³ / لتر ماء.

مدى امكانية خلط السماد مع غيره من الاسمدة والمبيدات: لا يقبل الخلط مع الاسمدة والمبيدات.
الاحتياطات :

يحفظ في عبوته الاصلية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.

تجنب الرش في فترة الظهيرة او ارتفاع الحرارة او الامطار او الرياح.

المصنع المنتج : توب فيرت للصناعات الكيماوية – (القطعة رقم (91 و)- المرحلة (الثانية) المنطقة الصناعية بوادي النطرون – محافظة البحيرة.
صلاحية المنتج : 5 سنوات من تاريخ الانتاج.

تاريخ الانتاج:

رقم التسجيل: 12763



توب فيرت للصناعات الكيماوية

Top Rose

Chemical composition:

Potassium 15 %	Boron 0.8 %
Zinc 3 %	Molybdenum 0.1%

Advantages and benefits of the compound:

- The compound contains most of the elements that help the process of flowering and needed by the plant at this stage.
- Liquid fertilizer provides the elements of Potassium, Zinc, Boron and Molybdenum in available and easy to absorb form.
- The compound helps to reduce the flowering period resulting in complete homogenies and integrated flowers.
- The presence of Zinc stimulates the production of cytokinin, which in turn in the release of color pigments and the formation of balanced coloring of the fruits.

Types of crops in which the compound is used: Used for all field crops, vegetables and fruits.

Usage rate, Dose/Fadden:

1 - In case of foliar spray, uses by rate 100-150 cm³/100 liters of water and spraying is repeated during the different growth stages of the plant.

2- In case of addition to irrigation water: used at the rate of 1.5 - 2 liters of water.

Dilution: 1- 1.5 cm³ / L water.

Mixing ability: Incompatible with fertilizers and pesticides.

شركة توب فيرت للصناعات الكيماوية

الإدارة والمبيعات: أبراج سيتى ستارز- برج رقم 5- الدور الخامس - مكتب رقم 11 - السادس من أكتوبر - الجيزة
المصنع : القطعة رقم (91 و)- المرحلة (الثانية) المنطقة الصناعية بوادي النطرون - محافظة البحيرة.

(+2)0238244844

01033329954 - 01000033714

E-mail: TF@TopfertEgypt.com

Website: <http://topfertegypt.com/>

أبراج سيتى ستارز - برج رقم 5 - الدور الخامس - مكتب رقم 11 - السادس من أكتوبر

موبايل : 201033329954 + تليفاكس : 20238244822 + 20238244844 بريد إلكترونى : TF@TopFertEgypt.com